



Windhalm

Taube Trespe

Gemeine Quecke


Ausfallgerste

MONITOR® – Die Expertenlösung

MONITOR® hat ein breites Wirkungsspektrum und ist dort, wo Windhalm, Trespe-Arten, Quecken oder Ausfallgerste auftreten, das Basisherbizid im Frühjahr.

MONITOR® erfasst viele Ungräser, hier sichert Splitting die Wirkung ab. Außerdem zeichnet sich MONITOR® durch sehr gute Kulturverträglichkeit aus.

Zur idealen Wirkunterstützung empfehlen wir das Netzmittel MonFast™.



Abstandsauflagen

MONITOR® hat günstige Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern und Saumbiotopen. Bei Verwendung von abdriftmindernder Technik kann der Abstand auf 0 m reduziert werden. Dabei sind die länderspezifischen Regelungen zu beachten.

Mischungsempfehlung

Leitverunkrautung: Windhalm, Klette und Mischverunkrautung

MONITOR® 8–12,5 g/ha

	+ MonFast™	Windhalm	Klettenlakkrout	Kamillearten	Sternmütterchen	Vogelmiere	Ackerhohlrh	Ausfallgras	Knötericharten	Taubnessel	Kornblume	Klatschmohn	Ehrenpreis
+ Primus® ¹⁾ (10–12,5 g/ha + 75 ml/ha)	ja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
+ Artus® ²⁾ (10–12,5 g/ha + 50 g/ha)	nein	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
+ Biathlon® ³⁾ (10–12,5 g/ha + 70 g/ha)	ja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
+ Pointer SX® ²⁾ (10–12,5 g/ha + 40–45 g/ha)	ja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
+ Starane XL® ¹⁾ (10–12,5 g/ha + 0,75 l/ha)	ja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
+ Concert SX® ²⁾ (8–10 g/ha + 80–100 g/ha)	ja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Empfehlung: Der Zusatz von MonFast™ stabilisiert die Wirkung.

Leitverunkrautung: Treppe (& Ausfallgerste), Quecke (& Ausfallgerste), Mischverunkrautung (Dikotyle & Windhalm)

MONITOR® 25 g/ha

	Windhalm	Trespearten	Quecke	Ausfallgerste	Flughäfer*	Ausfallgras	Ackerhohlrh	Klettenlakkrout	Knötericharten	Kamillearten	Vogelmiere	Sternmütterchen	Ehrenpreis	Taubnessel	Kornblume	Klatschmohn
+ MonFast™ 0,2%	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
+ MonFast™ 0,2% + Primus® ¹⁾ (75 ml/ha)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
+ MonFast™ 0,2% + Biathlon® ³⁾ (70 g/ha)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
+ MonFast™ 0,2% + Pointer SX® ²⁾ (40–45 g/ha)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
+ MonFast™ 0,2% + Starane XL® ¹⁾ (0,75 l/ha)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
+ MonFast™ 0,2% + Concert SX® ²⁾ (80–100 g/ha)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Sehr gute Wirkung

Gute Wirkung

Mittlere Wirkung

Geringe Wirkung

* 1–3-Blatt-Stadium des Flughäfers

Empfehlung: Der Zusatz von MonFast™ bei Treppe-Arten, Quecke und Ausfallgerste ist immer erforderlich. Splitting (2 x 12,5 g + MonFast™) sichert die Wirkung im Vergleich zur Einmalanwendung ab.

¹⁾ = reg. Marke Dow AgroSciences

²⁾ = reg. Marke Du Pont

³⁾ = reg. Marke BASF

Anwendungsempfehlung

Leitverunkrautung:

Windhalm
(+ Mischverunkrautung)

MONITOR® 10 g bis 12,5 g/ha
(+ Partner **ohne** Windhalmwirkung, **MonFast™ 0,2% oder AHL**)

MONITOR® 8 bis 10 g/ha
(+ Partner **mit** Windhalmwirkung, **MonFast™ 0,2% oder AHL**)

Leitverunkrautung:

Treppe-Arten

Quecke

Ausfallgerste

Klette

+/- Mischverunkrautung

Einfachanwendung

MONITOR® 25 g/ha + **MonFast™ 0,2%**
(+ Herbizidpartner und ggf. + CCC oder Fungizid; **kein AHL**)

Splittinganwendung

MONITOR® 12,5 g/ha + **MonFast™ 0,2%**
(+ Herbizidpartner; **kein AHL**)

MONITOR® 12,5 g/ha + **MonFast™ 0,2%**
(ggf. + CCC oder Fungizid; **kein AHL**)

Stadium Weizen/Triticale (BBCH)

21

25

29

30

32